

## Baumartenwahl

### Standortheimische Baumarten sind:

**Buche** (Fagus sylvatica), **Traubeneiche** (Quercus petraea), **Stieleiche** (Quercus robur), **Bergahorn** (Acer pseudoplatanus), **Spitzahorn** (Acer platanoides), **Feldahorn** (Acer campestre), [**\*Esche** (Fraxinus excelsior -*Gemeine Esche, Gewöhnliche Esche oder Hohe Esche*)], **Winterlinde** (Tilia cordata), **Sommerlinde** (Tilia platyphyllos), **Vogelkirsche** (Prunus avium), **Traubenkirsche** (Prunus padus), **Hainbuche** (Carpinus betulus), **Schwarzerle** (Alnus glutinosa), **Flatterulme** (Ulmus laevis), **Bergulme** (Ulmus glabra), **Elsbeere** (Sorbus torminalis), **Eberesche** (Sorbus aucuparia), **Mehlbeere** (Sorbus aria, Sorbus latifolia agg.), **Moor-Birke** (Betula pubescens), **Sandbirke** (Betula pendula), **Aspe** (Populus tremula), **\*\*Weide** (Silberweide, Bruchweide und Rötliche Bruchweide), **Wild-Holzbirne** (Pyrus pyraster), **Speierling** (Sorbus domestica), **Gemeine Kiefer** (Pinus sylvestris – nur im Homburger Becken) und **Europäische Eibe** (Taxus baccata).

**\*Der Anbau der ESCHE** (Fraxinus excelsior) wird aufgrund des möglichen Pilzbefalls („Falsches Weißes Stängelbecherchen“ -*Hymenoscyphus fraxineus*-) max. bis zu **20% am Baumartenanteil gefördert**.

**\*\*Sonstige Weidenarten** können als Vorwald nach Rücksprache mit der Fachbehörde gefördert werden.

### Standortgerechte Baumarten sind:

**Feldulme** (Ulmus minor), **Esskastanie** (Castanea sativa), **Echte Walnuss\*\*\*** (Juglans regia und nigra), **Rotfichte** (auch Gemeine Fichte, Gewöhnliche Fichte, Rottanne - Picea abies), **Weißtanne** (Abies alba), **Europäische Lärche** (Larix decidua), **Gemeine Kiefer** (Pinus Sylvestris)

### Keine standortheimische oder standortgerechte Baumarten sind:

„Gewöhnliche“ **Robinie** (Robinia pseudoacacia), **Roteiche** (Quercus rubra), **Küstentanne** (Abies grandis), „Gewöhnliche“ **Douglasie**“ (Pseudotsuga menziesii).

Der Anbau der folgenden Baumarten, wird toleriert (weder als standortheimisch noch als standortgerecht eingestuft) soweit ihr Anteil an der überschirmten Fläche jeweils 20 % nicht überschreitet.

### Pflanzenwahl (Bäume/Sträucher für Vorwald) in Schutzgebietskulissen

**Wiederbewaldungsmaßnahmen in Schutzgebieten sind generell auf die Schutzgebietsverordnung und falls vorhanden auf den Managementplan abzustimmen.**

**Entsprechende Unterlagen sind mit dem Förderantrag einzureichen.**

[https://www.saarland.de/mukmav/DE/portale/naturschutz/informationen/natura2000/management/management\\_node.html](https://www.saarland.de/mukmav/DE/portale/naturschutz/informationen/natura2000/management/management_node.html)

## **Moorwälder (91D0): Birken-Moorwald (91D1) und Waldkiefern-Moorwald (91D2)**

**Betula pubescens** (Moor-Birke, auch Haar-Birke, Besen-Birke, Glasbirke oder Behaarte Birke (91D1), **Pinus sylvestris** (Waldkiefer, auch Gewöhnliche oder Gemeine Kiefer, Rotföhre, Weißkiefer oder Forche) (91D2), **Sorbus aucuparia** (Vogelbeere, Eberesche oder Vogelbeerbaum), **Betula pendula** (Hänge-Birke, auch Sandbirke, Weißbirke oder Warzenbirke), **Frangula alnus**<sup>1</sup> (Faulbaum, genauer Echter Faulbaum), **Salix aurita**<sup>1</sup> (Ohr-Weide, Ohrchen-Weide oder Salbei-Weide), **Alnus glutinosa** (Schwarz-Erle, Schwarzerle), **Populus tremula** (Espe, Aspe oder Zitterpappel)

**fett:** Dominanzbildner, <sup>1</sup> häufig im Vorwald und/oder Pionierwald

## **Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0)**

**Alnus glutinosa** (Schwarz-Erle, Schwarzerle), **Carpinus betulus** ((Gemeine) Hainbuche, Weißbuche, Hagebuche oder Hornbaum), **Fraxinus excelsior** (Gemeine Esche, Gewöhnliche Esche oder Hohe Esche), **Quercus robur** (Stileiche, Sommereiche oder Deutsche Eiche), **Salix alba** (Silber-Weide), **Salix x rubens** (Fahlweide), **Acer pseudoplatanus** (Berg-Ahorn), **Prunus padus** (Gewöhnliche oder Gemeine Traubenkirsche), **Salix fragilis** (Bruch-Weide, auch Knack-Weide), **Salix triandra** (Mandelweide), **Salix purpurea** (Purpurweide oder auch Korbweide), **Salix viminalis** (Korbweide, Flechtweide, Hanfweide)

**fett:** Dominanzbildner,

## **Eichen-Ulmen-Eschenwälder (91F0)**

**Alnus glutinosa**(Schwarz-Erle, Schwarzerle), **Fraxinus excelsior**<sup>1</sup> (Gemeine Esche, Gewöhnliche Esche oder Hohe Esche), **Quercus robur** (Stileiche, Sommereiche oder Deutsche Eiche), **Ulmus laevis** (Flatterulme, auch Flatterrüster), **Carpinus betulus** ((Gemeine) Hainbuche, Weißbuche, Hagebuche oder Hornbaum), **Acer pseudoplatanus** (Berg-Ahorn), **Prunus padus** (Gewöhnliche oder Gemeine Trauben-kirsche), **Acer campestre** (Feldahorn, auch Maßholder)

**fett:** Dominanzbildner, <sup>1</sup> häufig im Vorwald und/oder Pionierwald

*kursiv:* wertgebende Arten

## **Hainsimsen-Buchenwald (9110)**

**Hauptbaumarten:** **Fagus sylvatica** (Rotbuche, Buche)

**Nebenbaumarten:** **Quercus petraea** (Traubeneiche, auch Winterliche), **Quercus robur** (Stileiche, Sommereiche oder Deutsche Eiche), **Acer pseudoplatanus** (Berg-Ahorn)

**Pioniergehölzarten:** **Betula pendula** (Hänge-Birke, auch Sandbirke, Weißbirke oder Warzenbirke), **Sorbus aucuparia** (Vogelbeere, gemeinsprachlich häufiger die Eberesche oder der Vogelbeerbaum), **Populus tremula** (Espe, Aspe oder Zitterpappel), **Salix caprea**

(Salweide, veraltete Schreibweise Saalweide), Quercus robur (Stileiche, Sommereiche oder Deutsche Eiche), Prunus avium (Vogel-Kirsche) Franqula alnus (Faulbaum)<sup>1</sup>

### **Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) (9130)**

**Hauptbaumarten:** Fagus sylvatica (Rotbuche, Buche)

**Nebenbaumarten:** Quercus robur (Stileiche, Sommereiche oder Deutsche Eiche), Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn), Fraxinus excelsior<sup>1</sup> (Gemeine Esche, Gewöhnliche Esche oder Hohe Esche), Carpinus betulus ((Gemeine) Hainbuche, Weißbuche, Hagebuche oder Hornbaum), Acer campestre (Feldahorn, auch Maßholder), Sorbus torminalis (Elsbeere)

**Pioniergehölzarten:** Betula pendula (Hänge-Birke, auch Sandbirke, Weißbirke oder Warzenbirke), Sorbus aucuparia (Vogelbeere, Eberesche oder Vogelbeerbaum), Populus tremula (Espe, Aspe oder Zitterpappel), Salix caprea (Salweide, veraltete Schreibweise Saalweide), Quercus robur (Stileiche, Sommereiche oder Deutsche Eiche), Prunus avium (Vogel-Kirsche)

<sup>1</sup>häufig im Vorwald und/oder Pionierwald

### **Mitteleuropäische Kalk-Buchenwälder (Cephalanthero-Fagion) (9150)**

**Hauptbaumarten:** Fagus sylvatica (Rotbuche, Buche), Fraxinus excelsior<sup>1</sup> (Gemeine Esche, Gewöhnliche Esche oder Hohe Esche), Carpinus betulus ((Gemeine) Hainbuche, Weißbuche, Hagebuche oder Hornbaum), Acer campestre (Feldahorn, auch Maßholder), Sorbus torminalis (Elsbeere)

**Nebenbaumarten:** Quercus petraea (Traubeneiche, auch Winterliche), Sorbus aria (Echte Mehlbeere) (Nied- und Moselgau), Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn)

**Pioniergehölzarten:** Betula pendula (Hänge-Birke, auch Sandbirke, Weißbirke oder Warzenbirke), Populus tremula (Espe, Aspe oder Zitterpappel), Salix caprea (Salweide, veraltete Schreibweise Saalweide), Prunus avium (Vogel-Kirsche)

### **Subatlantischer und mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum] (9160)**

**Hauptbaumarten:** Carpinus betulus ((Gemeine) Hainbuche, Weißbuche, Hagebuche oder Hornbaum), Quercus robur (Stileiche, Sommereiche oder Deutsche Eiche), Fraxinus excelsior<sup>1</sup> (Gemeine Esche, Gewöhnliche Esche oder Hohe Esche)

**Nebenbaumarten:** Fagus sylvatica (Rotbuche, Buche), Prunus padus (Gewöhnliche oder Gemeine Traubenkirsche), Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn), Acer campestre (Feldahorn, auch Maßholder), Prunus avium (Vogel-Kirsche), Sorbus torminalis (Elsbeere)

**Pioniergehölzarten:** Betula pendula (Hänge-Birke, auch Sandbirke, Weißbirke oder Warzenbirke), Prunus avium (Vogel-Kirsche), Sorbus aucuparia (Vogelbeere, Eberesche oder Vogelbeerbaum)

**Fett:** Dominanzbildner, <sup>1</sup>häufig im Vorwald und/oder Pionierwald

### **Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum) (9170) (= Eichen-Elsbeeren-Wald sensu P. Haffner)**

**Hauptbaumarten:** Sorbus torminalis (Elsbeere), Quercus petraea (Traubeneiche, auch Wintereiche), Carpinus betulus ((Gemeine) Hainbuche, Weißbuche, Hagebuche oder Hornbaum), Acer campestre (Feldahorn, auch Maßholder)

**Nebenbaumarten:** Sorbus aria (Echte Mehlbeere), Sorbus latifolia agg. (Breitblättrige Mehlbeere (*Sorbus latifolia*) (in Frankreich als „Alisier de Fontainebleau“ übersetzt „Speierling von Fontainebleau“ bezeichnet) ist ein Bastard, der zum Komplex der Bastard-Mehlbeeren (*Sorbus latifolia* agg.) gehört), Pyrus pyraeaster (Wildbirne oder Holzbirne), Fraxinus excelsior<sup>1</sup> (Gemeine Esche, Gewöhnliche Esche oder Hohe Esche), Quercus pubescens-Hybriden (Flaumeiche)

**Pioniergehölzarten:** Betula pendula (Hänge-Birke, auch Sandbirke, Weißbirke oder Warzenbirke), Populus tremula (Espe, Aspe oder Zitterpappel), Salix caprea (Salweide, veraltete Schreibweise Saalweide), Prunus avium (Vogel-Kirsche)

**Fett:** Dominanzbildner, <sup>1</sup>häufig im Vorwald und/oder Pionierwald

### **Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) (9180)**

**Haupt- und Nebenbaumarten:** Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn), Ulmus glabra (Bergulme), Tilia platyphyllos (Sommerlinde, Sommer-Linde, „Großblättrige Linde“), Quercus petraea (Traubeneiche, auch Wintereiche), Carpinus betulus ((Gemeine) Hainbuche, Weißbuche, Hagebuche oder Hornbaum), Fraxinus excelsior<sup>1</sup> (Gemeine Esche, Gewöhnliche Esche oder Hohe Esche), Tilia cordata (Winterlinde, Steinlinde, „Herzblättrige Linde“, „Herz[blatt]linde“), Acer platanoides (Spitzahorn, Spitz-blättriger Ahorn)

**Fett:** Dominanzbildner, <sup>1</sup>häufig im Vorwald und/oder Pionierwald